




## SINTOMAS DEL ZIKA

**Fiebre**



**Dolor de cabeza y  
detrás de los ojos**



**Vomito o dolor  
abdominal**



**Dolor muscular y  
en las articulaciones**



**Sarpullido**



### Virus Zika (ZIKV): medicamentos que NO debes ingerir

- Cataflan
  - Diclofenac de sodio
  - Voltaren, Voltaren XR
  - Lodine, Lodine XL
  - Fenopropion de calcio
  - Nabumetone
  - Flurbiprofeno
  - Aine
  - Ibuprofeno
  - Indometacina
  - Indocin, Indocin SR
  - Ketoprofeno
  - Meclofenamato de sodio
  - Tolmetin de sodio
  - Mefenamic ácido
  - Naprosyn, Naprelan
  - Naproxeno de sodio
  - Ponstel
  - Meloxicam
  - Moabic
  - Nalfox
  - Relafen
  - Anirotec
  - Diflunisal
  - Dolobid
  - Etoricoac
  - Naproxeno
  - Oxaprozin
  - Deypro
  - Piroxican
  - Felidene
  - Sulindac
  - Cimoril
  - Celecoxib
- Compuestos con aspirina:**  
Anaisin, Bayer, Bufferin, Excedrin



GOBIERNO DE LA  
REPUBLICA DE HONDURAS



GABINETE SECTORIAL  
DE  
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

# Dengue, Chikunguya y Zika

se puede prevenir con tu ayuda



**Juntos podemos  
prevenir el ZIKA**



Usá repelentes,  
espirales y  
mosquiteros.



Si tenés fiebre alta, dolor  
de cabeza, muscular o  
abdominal y manchas en  
la piel consulta a un médico



Evita tener objetos  
que contengan  
agua estancada.




Reforzará la  
limpieza  
de tu casa

# ¿Que es el ZIKA?

La infección por el virus de Zika es causada por la picadura de mosquitos infectados del género Aedes, y suele generar fiebre leve, sarpullidos, conjuntivitis y dolores musculares.

El virus fue aislado por primera vez en 1947 en el bosque de Zika, en Uganda (África). Desde entonces, se ha encontrado principalmente en África y ha generado brotes pequeños y esporádicos también en Asia. En 2007 una gran epidemia fue descrita en la Isla de Yap (Micronesia), donde cerca del 75% de la población resultó infectada.

El 3 de marzo de 2014, Chile notificó a la OPS/OMS la confirmación de un caso de transmisión autóctona de fiebre por virus del Zika en la Isla de Pascua. La presencia del virus se detectó hasta junio de ese año en esa área.



Por el momento no hay vacunas ni tratamientos específicos para esta enfermedad

La Mejor forma de prevenir el zika es en practicar ciertas hábitos de limpieza.

se sabe que el virus circula en África, las Américas, Asia y el Pacífico.

## Datos a tomar en cuenta

## El riesgo en embarazadas

Hasta el momento existen dos teorías de contagio de madre a hijo

- 1) El virus se trasmite al feto por vía sanguínea.
- 2) el virus se transmite al feto por vía placentaria.

Se ha relacionado con casos de microcefalia y otros problemas de salud en bebés cuya madre se contagiaron con el virus cuando estaban embarazadas.